

## **Richtlijn**

### **Vaginaal toedienen van geneesmiddel**

#### **Doel**

Het toedienen van voorgeschreven medicatie.

#### **Algemene opmerkingen**

De handeling mag alleen worden verricht in opdracht van een arts.

#### **Benodigheden**

- Geneesmiddel
- Doseringsvoorschrift + reden waarom het medicijn ingenomen wordt
- Inbrengcanule
- Wegwerphandschoenen

#### **Voorbereiding**

- Stel jezelf op de hoogte van de werking en de bijwerking(en) van het geneesmiddel
- Controleer van het geneesmiddel de naam, dosis, toedieningwijze, vervaldatum, tijdstip van inname
- Vermeld, na het voor de eerste keer openen van de flacon, de datum op het etiket
- Zet alle benodigheden binnen handbereik
- Doe sieraden af.
- Handen wassen
- Zorg voor privacy
- Vertel de cliënt het doel van de handeling; wat er gaat gebeuren en dat alles pijnloos kan verlopen, of indien deze dit niet kan begrijpen: noem de naam van de cliënt en vertel dat er iets gaat gebeuren.  
Vertel de cliënt ook dat de handeling als onprettig kan worden ervaren

#### **Werkwijze**

- Laat de cliënt het onderlichaam ontbloten en een geschikte houding aannemen
- Trek de handschoenen aan
- Breng het geneesmiddel volgens gebruiksaanwijzing in

#### **Bij een vaginale zetpil (ovule):**

- Neem de ovule uit de verpakking.
- Breng het medicijn in de inbrenghuls en houd dit vast in de hand waarmee het medicijn ingebracht wordt.
- Spreid met de andere hand de schaamlippen.
- Breng de inbrenghuls met het medicijn in de vagina.
- Druk met de inbrenghuls het medicijn in de vagina.
- Trek de inbrenghuls terug uit de vagina volgens de gebruiksaanwijzing.

#### **Bij een crème:**

- Draai de dop van de tube, draai de dop om en prik met de doorprikpunt de tube open.
- Draai de tuit van de applicator op de tube.
- Knijp in de tube totdat de crème de applicator vult tot aan de markeringsring.
- Draai de applicator los van de tube en doe de dop op de tube.
- Spreid de schaamlippen met de ene hand.

- Breng met de andere hand het uiteinde van de applicator zo diep mogelijk in de vagina.
  - Druk de zuiger van de applicator langzaam helemaal in.
  - Trek de applicator terug uit de vagina.
- Bij het inbrengen van een ovule de cliënt 10 minuten laten liggen en vragen niet te persen
  - Controleer of het geneesmiddel er in blijft
  - Doe de handschoenen uit
  - Ruim het materiaal
  - Handen wassen.
  - Noteer in het dossier (of ander afgesproken plaats) dat de medicatie is toegediend.

### **Complicaties**

Zie de bijsluiter van het geneesmiddel.

Complicaties moeten altijd in het zorgdossier worden opgeschreven en aan de arts te worden gemeld.

### **Mag zelfstandig worden verricht door**

Verpleegkundige is bevoegd

Andere zorgverleners als men beschikt over een bekwaamheidsverklaring (afhankelijk van het beleid van de organisatie waar men werkt)

#### **Let op:**

Het is de bedoeling met deze richtlijn een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig worden aangepast aan de individuele wensen van de cliënt. Bij twijfel ten aanzien van de uitvoering van deze richtlijn of in situaties waarin deze richtlijn niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende.

Afwijken van deze richtlijn kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van deze richtlijn te allen tijde moeten kunnen motiveren. Deze richtlijn is slechts een hulpmiddel en kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener / ondersteuner.

De zorgverlener / ondersteuner kent en neemt bij het hanteren van deze richtlijn zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Deze richtlijn is niet bedoeld voor particulier gebruik.

**Auteur:** D.Slagter, verpleegkundige

**Publicatiedatum:** 1 mei 2001

**Laatste herziening:** 07-03-2011

**Disclaimer:** De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze richtlijn. Raadpleeg zo nodig de arts.

**Copyright** © 2001 - 2012 Dick Slagter All rights Reserved.